

推荐成人(有额外风险因素或其他适应症)按年龄组划分的免疫接种时间表,美国,2022年

疫苗	19-26岁	27-49岁	50-64岁	65岁以上
灭活流感疫苗 (IIV4) 或重组流感疫苗 (RIV4)	每年 1 剂	每年 1 剂	每年 1 剂	每年 1 剂
破伤风、白喉、百日咳 (Tdap 或 Td)	每次怀孕 1 剂 Tdap; 1 剂 Td/Tdap 用于伤口管理(咨询提供者)	每次怀孕 1 剂 Tdap; 1 剂 Td/Tdap 用于伤口管理(咨询提供者)	每次怀孕 1 剂 Tdap; 1 剂 Td/Tdap 用于伤口管理(咨询提供者)	每次怀孕 1 剂 Tdap; 1 剂 Td/Tdap 用于伤口管理(咨询提供者)
水痘 (VAR)	2 剂(如果出生于 1980 年或之后)	2 剂(如果出生于 1980 年或之后)	2 剂	2 剂
重组带状疱疹疫苗 (RZV)	2 剂用于免疫功能低下的情况(咨询提供者)	2 剂用于免疫功能低下的情况(咨询提供者)	2 剂	2 剂
肺炎球菌 (PCV15、PCV20、PPSV23)	1 剂 PCV15, 之后接种 PPSV23 或 1 剂 PCV20 (咨询提供者)	1 剂 PCV15, 之后接种 PPSV23 或 1 剂 PCV20 (咨询提供者)	1 剂 PCV15, 之后接种 PPSV23 或 1 剂 PCV20 (咨询提供者)	1 剂 PCV15, 之后接种 PPSV23 或 1 剂 PCV20 (咨询提供者)
甲型肝炎 (HepA)	2 或 3 剂, 取决于疫苗	2 或 3 剂, 取决于疫苗	2 或 3 剂, 取决于疫苗	2 或 3 剂, 取决于疫苗
乙型肝炎 (HepB)	2、3 或 4 剂, 取决于疫苗或病情	2、3 或 4 剂, 取决于疫苗或病情	2、3 或 4 剂, 取决于疫苗或病情	2、3 或 4 剂, 取决于疫苗或病情
脑膜炎球菌 A、C、W、Y (MenACWY)	1 或 2 剂, 取决于适应症, 请参阅关于加强针建议的说明	1 或 2 剂, 取决于适应症, 请参阅关于加强针建议的说明	1 或 2 剂, 取决于适应症, 请参阅关于加强针建议的说明	1 或 2 剂, 取决于适应症, 请参阅关于加强针建议的说明
B 型脑膜炎球菌 (MenB)	2 或 3 剂, 取决于疫苗和适应症, 请参阅关于加强针建议的说明	2 或 3 剂, 取决于疫苗和适应症, 请参阅关于加强针建议的说明	2 或 3 剂, 取决于疫苗和适应症, 请参阅关于加强针建议的说明	2 或 3 剂, 取决于疫苗和适应症, 请参阅关于加强针建议的说明
b 型流感嗜血杆菌 (Hib)	1 或 3 剂, 取决于适应症	1 或 3 剂, 取决于适应症	1 或 3 剂, 取决于适应症	1 或 3 剂, 取决于适应症

建议 5 岁及以上儿童接种 COVID-19 疫苗。一个人在接种了所有建议的 COVID-19 疫苗针剂(包括符合条件时接种任何加强针), 即视为充分接种 COVID-19 疫苗。

