



COVID-19 疫苗和加强针

	Pfizer	Moderna	Johnson & Johnson (J&J)
建议接种年龄	5 岁以上	18 岁以上	18 岁以上
初级系列	2 剂 间隔 3 周 (21 天)。	2 剂 间隔 4 周 (28 天)。	1 剂
加强针	应在其初级系列的最后一剂至少 5 个月后接种加强针。	您应在接种初级系列的最后一剂至少 5 个月后接种加强针。	您应该在第一剂 J&J/Janssen COVID-19 疫苗至少 2 个月后接种 Pfizer-BioNTech 或 Moderna (mRNA COVID-19 疫苗) 的加强针。
我何时才能“充分接种”?	少于 5 个月前接种 2 剂初级系列或完成初级系列 5 个月后接种加强针。	少于 5 个月前接种 2 剂初级系列或完成初级系列 5 个月后接种加强针。	少于 2 个月前接种 1 剂初级系列或完成初级系列 2 个月后接种加强针。
如果我有中度或重度免疫功能低下,我什么时候才能“充分接种”?	少于 28 天前接种 2 个剂量系列;或少于 3 个月前接种额外 1 剂(接种第 3 剂以完成初级系列);或完成初级 3 个剂量系列 3 个月后接种加强针(第 4 剂)。	少于 28 天前接种 2 个剂量系列;或者少于 3 个月前接种额外 1 剂(接种第 3 剂以完成初级系列);或完成初级 3 个剂量系列 3 个月 后接种加强针(第 4 剂)。	少于 28 天前接种 1 剂初级系列;少于 2 个月前接种额外 1 剂(第 2 剂, Moderna 或 Pfizer); 接种第二剂 2 个月后接种加强针, 最好使用 Moderna 或 Pfizer(共 3 剂)。
第 2 剂加强针	12 岁以上 免疫功能低下 50 岁以上	18 岁以上 免疫功能低下 50 岁以上	只能 接种 mRNA; 18 岁以上, 免疫功能低下; 18-49 岁, 已接种初级和 J&J 加强针; 50 岁以上